



NAVODILA ZA STARŠE OTROK, KI SO IMELI VROČINSKE KRČE

Spoštovani starši,
Vaš otrok je imel **VROČINSKI KRČE**.

Kratkotrajni vročinski krči za otroka niso nevarni in ne puščajo posledic za otrokovo zdravje. Vročinski krči se v otroštvu pred 4. letom starosti lahko ob povišani telesni temperaturi **PONOVIJO, zato Vam želimo posredovati UKREPE, s katerimi skušamo to preprečiti.**

V kolikor vaš otrok zboli s povišano telesno temperaturo preko 38°C ga pričnite **OHLAJATI**:

1. OTROK NAJ BO ČIM MANJ OBLEČEN ALI POKRIT
2. Mlačna koPel
3. Hladni napitki
4. ANTIPIRETIKI (Panadon, Paracetamol, Ibuprofen/Brufen, Voltaren,...)

V kolikor se **KRČI PONOVIJO** in **TRAJAJO DLJE KOT 2 minuti**,

uporabite zdravilo, ki učinkovito **PREKINJA KRČE**:

STESOLID 5mg (za otroke < 13kg) ali

STESOLID 10mg (za otroke > 13kg)

KAKO APLICIRAMO STESOLID?

Otroka položimo na desni bok s pokrčenimi kolena. Odstranimo pokrovček s cevke ter konico namažemo s hladilnim mazilom ali vazelinom. Nato otroku v zadnjično odprtino nežno vstavimo cevko ter jo potisnemo do konca nastavka v zadnjico (če je otrok mlajši od 3 let, le do polovice). Popolnoma iztisnemo vsebino rektalne cevke in jo nato počasi izvlečemo. Tudi med odstranjevanjem rektalno cevko stiskamo, da se zdravilo ne vrne v aplikator. Otroku nato še nekaj časa stiskamo zadnjico, da preprečimo iztekanje zdravila. Zaželeno je, da je rektalna cevka med iztiskanjem zdravila obrnjena navpično navzdol, ker le tako zagotovimo popolno porabo zdravila.

V kolikor KRČI NE PRENEHAJO v 5 minutah, postopek PONOVIJO s STESOLIDOM 5mg.

TO JE NAJVIŠJI PRIPOROČEN ODMEREK!

Čimprej odidemo do najbližje zdravstvene ustanove oziroma osebnega zdravnika.

Zdravilu obvezno preverjajte rok uporabe!