



NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNEGA BRISA NA PRISOTNOST JAJČEC PODANČIC

Jajčeca glist podančic (*Enterobius vermicularis*) redko najdemo pri preiskavi vzorca blata na parazite, ker jih samice parazita ne odlagajo v črevesju, ampak v toplo in vlažno kožo perianalnih gub (okoli zadnjika). Jajčeca odkrijemo s pregledom **perianalne brisa** (odtis lepilnega traku z zadnjika in kože okoli zadnjika).

PRED ODVZEMOM BRISA

Vzorec perianalnega celofanskega brisa je potrebno odvzeti **zjutraj pred umivanjem, uriniranjem in iztrebljanjem**. Zvečer se na okolico zadnjika ne sme nanašati krem.

V ambulanti, ki vas je na preiskavo napotila ali v laboratoriju dobite objektno stekelce, prozorni lepilni trak ter plastično vrečko in kuverto.

ODVZEM BRISA

Perianalni celofanski bris odvezmete tako, da lepljivo površino traku previdno pritisnete na področje perianalnih gub (okrog zadnjika) in presredka. S prstom podrgnete lepilni trak, da se prilepi in ga takoj odlepate. Pazite, da se lepilni trak ne pomečka. Nato lepilni trak pazljivo nalepite na objektno stekelce tako, da pod lepilnim trakom ni zračnih mehurčkov.

Pripravljen preparat vstavite v plastično vrečko in si nato temeljito umijte roke z milom. Plastično vrečko vstavite v kuverto, na katero napišete ime in priimek preiskovanca in ga čim prej (isti dan – do 12.00 ure) prinesite v laboratorij. Če imate več vzorcev jih pospravite vsakega v svojo ustrezno označeno kuverto.